



روسای محترم کلیه دانشگاهها / دانشکده های علوم پزشکی کشور
جناب آقای دکتر رضوی
دبیر و رئیس محترم دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت
جناب آقای دکتر محمدمهدی ناصحی
رئیس محترم هیات مدیره و مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران
جناب آقای دکتر امیر نوری
مدیر عامل محترم سازمان خدمات درمانی وزارت دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح
جناب آقای دکتر مصطفی سالاری
مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی
موضوع: ابلاغ استاندارد معاینه جامع شبکه چشم نوزاد نارس

با سلام و احترام

همانگونه که مطلع می‌باشید یکی از راهکارهایی که برای پیشگیری از افزایش هزینه‌های درمان و تحمیل بار اقتصادی سنگین به نظام سلامت و جامعه در کشورهای مختلف مورد توجه است تدوین و نشر راهنماهای بالینی مبتنی بر شواهد است که به عنوان یکی از سیاست های برنامه تحول نظام سلامت و یکی از محورهای بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی نیز مورد توجه می باشد. در همین راستا معاونت درمان تدوین محصولات دانشی را (راهنمای بالینی، استاندارد، پروتکل و ...) با اولویت خدمات پر تواتر، دارای پوشش بیمه ای، هزینه (خدمات، تجهیزات) با حضور جمعی از اساتید حوزه های مختلف، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل و سیاستگذاری و برنامه ریزی این امر را عهده دار شده است. لذا در راستای پویا سازی ارائه خدمات پزشکی و اجرایی نمودن بند "ث و ج" ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر اجازه تجویز خدمات و انجام خرید راهبردی سازمان های بیمه گر بر اساس دستورالعمل ها و راهنماهای بالینی توسط وزارت بهداشت، استاندارد "معاینه جامع شبکه چشم نوزاد نارس" با کد ملی ۹۰۱۹۴۷ به تصویب رسیده و از تاریخ ابلاغ قابل اجرا است.

بدیهی است ضمن تاکید بر ارائه خدمت در چارچوب استانداردهای مورد تأیید وزارت متبوع، اعلام می گردد دانشگاه / دانشکده، انجمن ها و سازمان نظام پزشکی میبایست از این محصولات در آموزش های بازآموزی استفاده و سازمان های بیمه گر نیز بر اساس محصولات دانشی اقدام به خرید راهبردی نمایند. امید است با بهره مندی از تلاش جمعی و اطلاع رسانی در این زمینه، شاهد تحولی جدی در حوزه استقرار و بکارگیری راهنماها به منظور ارتقای کیفیت خدمات و کاهش هزینه های غیر ضروری باشیم.



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت

بسمه تعالی

شماره ۴۰۰/۲۳۳۹۲ د
تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
پیوست دارد

دکتر قاسم جان بابایی



معاون درمان



دبیرخانه شورای راهبردی تدوین راهنماهای سلامت

شناسنامه و استاندارد خدمت

معاینه جامع شبکه نوزاد نارس

زمستان ۱۳۹۹

تنظیم و تدوین:

کارگروه تخصصی نوزادان و اطفال

کارگروه تخصصی چشم پزشکی

تحت نظارت فنی:

گروه استانداردسازی و تدوین راهنماهای سلامت

دفتر ارزیابی فن آوری، استانداردسازی و تعرفه سلامت

الف) عنوان دقیق خدمت مورد بررسی (فارسی و لاتین):

Screening of Retinopathy of Prematurity

معاینه جامع شبکیه چشم نوزاد نارس

کد ملی: ۹۰۱۹۴۷

ب) تعریف و تشریح خدمت مورد بررسی:

غربالگری رتینوپاتی در نوزادان نارس یکی از اصول اساسی مراقبت این گروه از نوزادان می باشد که در صورت عدم انجام ، منجر به کوری نوزاد می گردد.

غربالگری نوزادان نارس به دو روش در سراسر دنیا انجام می شود:

۱-روش Conventional یا مرسوم: معاینه چشم نوزاد نارس با باز کردن مردمکها توسط چشم پزشک

۲-روش مبتنی بر تصویربرداری یا تله مدیسین: تصاویر از شبکیه نوزاد نارس پس از باز کردن مردمکها توسط دوربین های تصویر برداری شبکیه گرفته شده و ارسال تصاویر به صورت فیزیکی (ارسال پرینت و یا لوح فشرده تصاویر) و یا ارسال الکترونیک (ایمیل یا آپ لود در سامانه)، به چشم پزشک.

این روشها در نوزادان بستری و سرپایی قابل انجام است.

تبصره: (جهت ارائه خدمت به روش تله مدیسین با توجه به متفاوت بودن فرایند ارائه خدمت نیاز به تدوین شناسنامه مجزا می باشد)

ت) موارد ضروری انجام مداخله تشخیصی (اندیکاسیون ها)

براساس پروتکل کشوری مصوب کارگروه کشوری رتینوپاتی نوزادان نارس (آخرین ویراست ۱۳۹۴)، هر نوزاد نارس متولد شده با سن حاملگی کمتر از ۳۴ هفته و یا وزن کمتر و مساوی ۲۰۰۰ گرم نیازمند غربالگری می باشد. نوزادان بزرگتر از مورد فوق با تشخیص فوق تخصصی نوزادان یا متخصص کودکان ارجاع می گردند.

ج) تواتر ارائه خدمت:

زمان اولین معاینه بعد از تولد بر اساس سن حاملگی (Gestational age) مشخص میگردد:

۱-نوزادان متولد شده با سن حاملگی کمتر از ۲۷ هفته در هفته ی ۳۱ سن اصلاح شده به شرط اینکه هیچگاه بیشتر از ۶ هفته پس از تولد نباشد

۲-نوزادان ۲۷ هفته و بزرگتر در ۲۸ روزگی پس از تولد

ج-۱) تعداد دفعات مورد نیاز

بر اساس نتایج معاینات متغیر است و تا زمان کامل شدن عروق شبکیه ادامه مییابد(مقادیر زیر به صورت میانه بیان شده است).

سن حاملگی	دفعات بررسی شبکیه	زمان تقویمی پیگیری
کمتر از ۲۶ هفته	تا ۱۲ بار	تا ۶ ماه پس از تولد
۲۶-۲۸ هفته	تا ۱۰ بار	تا ۶ ماه پس از تولد
۲۹ و ۳۰ هفته	تا ۸ بار	تا ۶ ماه پس از تولد
۳۱ و ۳۲ هفته	تا ۶ بار	تا ۶ ماه پس از تولد
۳۳ هفته	تا ۳ بار	تا ۶ ماه پس از تولد
۳۴ هفته و بالاتر	تا ۲ بار	تا ۶ ماه پس از تولد
موارد درمان شده با لیزر	تا ۸ بار	تا ۳ ماه بعد از درمان
موارد درمان شده با تزریق	تا ۸ بار	تا ۳ ماه بعد از درمان
موارد درمان شده با ویتراکتومی و باند	تا ۸ بار	تا ۳ ماه بعد از درمان

ج-۲) فواصل انجام

بر اساس نتیجه ی آخرین معاینه توسط چشم پزشک (با استناد به جدول زیر) مشخص میگردد.

جدول زمان معاینات پیگیری بر اساس یافته های معاینه نوبت قبلی چشم

منطقه شبکیه	Stage of retinal findings	فواصل پیگیری
Zone I	Immature vascularization, no ROP	1-2 هفته
	Stage 1 or 2	1 هفته یا کمتر
	Regressing ROP	1-2 هفته
Zone II	Immature vascularization, no ROP	2-3 هفته
	Stage 1	2 هفته
	Stage 2	1-2 هفته
	Stage 3	1 هفته یا کمتر
	Regressing ROP	1-2 هفته
Zone III	Stage 1 or 2	2-3 هفته
	Regressing ROP	2-3 هفته

(د) فرد/افراد صاحب صلاحیت جهت تجویز (Order) خدمت مربوط و استاندارد تجویز:

- فوق تخصص نوزادان، متخصص کودکان، فلوشیپ رتین، متخصص چشم پزشکی ، دستیار فوق تخصص نوزادان، دستیار تخصصی کودکان، دستیار تخصصی چشم پزشکی (در مورد دستیاران دو سال آخر به عنوان تجویزکننده قابل قبول است)

(هـ) ویژگی های ارائه کننده اصلی صاحب صلاحیت جهت ارائه خدمت مربوط:

- فلوشیپ شبکیه دوره دیده دارای گواهی معتبر

-متخصص چشم پزشکی دوره دیده به استناد گواهی از مراکز منتخب کمیته کشوری رتینوپاتی نوزادان نارس

(و) عنوان و سطح تخصص های مورد نیاز (استاندارد) برای سایر اعضای تیم ارائه کننده خدمت:

ردیف	عنوان تخصص	میزان تحصیلات مورد نیاز	سابقه کار و یا دوره آموزشی مصوب در صورت لزوم	نقش در فرایند ارائه خدمت
۱	پرستار	کارشناس به بالا	حداقل ۳ ماه	مسئول آماده سازی نوزاد مسئول کنترل علایم حیاتی
۲	بهبیار	دیپلم	حداقل ۳ ماه	مسئول آماده سازی نوزاد مسئول کنترل علایم حیاتی
۳	منشی یا اپراتور سامانه	دیپلم یا بالاتر	حداقل ۲ ماه	معرفی نوزاد در سامانه ثبت داده در سامانه ایمان و پیگیری موارد عدم مراجعه و اطلاع رسانی

تبصره: حضور پرستار یا بهبیار (دارای گواهی احیاء نوزاد از معاونت درمان دانشگاه مبدا) برای ارائه خدمت کافی است.

ز) استانداردهای فضای فیزیکی و مکان ارائه خدمت:

— بخش های مراقبت ویژه نوزادان

— بخش های نوزادان

— درمانگاهها

— اتاق عمل های چشم پزشکی

➤ حداقل ۹ متر مربع فضا

ج) تجهیزات پزشکی سرمایه ای به ازای هر خدمت:

ردیف	عنوان تجهیزات	شناسه فنی	کاربرد در فرایند ارائه خدمت	متوسط عمر مفید تجهیزات	تعداد خدمات قابل ارائه در واحد زمان	متوسط زمان کاربری به ازای هر خدمت	امکان استفاده همزمان جهت ارائه خدمات مشابه و یا سایر خدمات
۱	لیداسپلوکوم	سایز ۱ تا ۳	باز کردن پلک ها در زمان معاینه	۱ سال	یک عدد برای هر بیمار	۱۰ دقیقه	یک عدد برای هر نفر زیرا باید استریل شود
۲	لنز لوپ	سایز ۱	پوزیشن دادن و ایندنت کردن در زمان معاینه	۱ سال	یک عدد برای هر بیمار	۱۰ دقیقه	یک عدد برای هر نفر زیرا باید استریل شود
۳	لنز مثبت ۲۰ لنز مثبت ۳۰	۲۰+ و ۳۰+	استفاده در ایندایرکت افتالموسکوپی	۱۰ سال	تمام بیماران	۱۰ دقیقه	تمام بیماران

- امکانات کاهش درد (فنداق، روش های مکیدن غیر تغذیه ای، محلول سوکروزخوراکی)
- مانیتورینگ (پالس اکسیمتر)
- تجهیزات احیای نوزاد

ط) داروها، مواد و لوازم مصرفی پزشکی جهت ارائه هر خدمت:

ردیف	اقلام مصرفی مورد نیاز	میزان مصرف (تعداد یا نسبت)
۱	قطره آماده سازی مردمک میدراکس ۱٪	۱ عدد به ازای هر ۱۵ بیمار
۲	قطره آماده سازی مردمک فنیل افرین ۰.۵٪	۱ عدد به ازای هر ۱۵ بیمار
۳	اشک مصنوعی	۱ عدد به ازای ۴۰ بیمار
۴	تتراکائین	۱ عدد به ازای هر ۱۵ بیمار

ظ) اقدامات ضروری پاراکلینیکی، تصویربرداری و دارویی مورد نیاز جهت ارائه خدمت:

قبل از ارائه خدمت:

- گرفتن شرح حال شامل اطلاعات حاملگی و زایمان و بستری
- گرفتن شرح حال در خصوص موارد منع مصرف قطره های آماده سازی
- بررسی از نظر احتمال وجود عفونت های ملتحمه و احتمال انتشار آنها و کنترل عفونت
- کنترل علائم حیاتی
- آماده سازی قطره ترکیبی آراوپی (شامل قطره میدراکس با غلظت کمتر از نیم درصد - فنیل افرین چشمی با غلظت کمتر از ۰.۲۵٪، طبق نظر چشم پزشک تتراکائین درقطره ترکیبی و یا جداگانه استفاده می شود.)
- دریافت قطره ترکیبی در ۴ نوبت به فاصله هر ۵ دقیقه و انتظار ۴۵ دقیقه برای باز شدن مردمک
- کنترل علائم حیاتی در طول مدت انتظار

حین ارائه خدمت:

- کنترل علائم حیاتی
- قنداق کردن نوزاد و استفاده از قطره بیحسی، شروع بی دردی
- گذاشتن لید اسپکولوم و شروع معاینه
- بررسی کامل شبکیه
- در آوردن لید اسپکولوم، کنترل علائم حیاتی
- ثبت گزارش و توضیح به والدین در خصوص پیگیری و اقدامات درمانی
- شروع تغذیه و کنترل علائم حیاتی
- ترخیص

کنترل عوارض جانبی :

- توصیه های بهداشتی در صورت وجود ریسک کونژونکتیویت و موارد دیگر

-توصیه های لازم در خصوص تغذیه و احتمال آبنه

-توصیه های مراقبتی در خصوص احتمال بروز خونریزی های سطحی ملتحمه و اکیموز پلک

ی) استانداردهای گزارش:

-شامل ناحیه ابتلا(zone)

-شدت ابتلا در صورت ابتلا(stage)

-وجود یا عدم وجود فعالیت عروقی(plus)

-ذکر زمان دقیق پیگیری و اقدامات درمانی بعدی در صورت لزوم

➤ در صورت فعال شدن ثبت گزارش در سامانه ایمان در آینده ، استناد به گزارش مذکور انجام خواهد شد .

ک) شواهد علمی در خصوص کنتراندیکاسیون های دقیق خدمت:

ندارد

ل) مدت زمان ارائه هر واحد خدمت:

۱۰ تا ۱۵ دقیقه

ع) مدت اقامت در بخش های مختلف بستری جهت ارائه هر بار خدمت مربوط:

معاینه جامع شبکه نوزاد نارس به تنهایی نیاز به بستری ندارد ولی با توجه به شرایط زمینه ای نوزاد ممکن است قبل، بعد یا حین معاینه نیاز به بستری پیدا کند. در نوزادان ترخیص شده در صورتیکه از نظر پزشک معالج فوق نوزادان یا کودکان منعی برای معاینه سرپایی وجود نداشته باشد، چشم پزشک آن را در درمانگاه انجام خواهد داد.

ف) موارد ضروری جهت آموزش به بیمار :

- آموزش والدین در حین بستری نوزاد نارس درباره لزوم انجام معاینه غربالگری
- انجام غربالگری براساس سن بارداری نوزاد در زمان مقرر و یا ۲۸ روزگی نوزاد
- در صورت ترخیص زود هنگام نوزاد، پیگیری فعال جهت انجام معاینه در زمان مقرر
- ارائه پمفلت های مرتبط با غربالگری رتینوپاتی نوزادان نارس به والدین

- آموزش لزوم پیگیری معاینه های دوره ای و مراجعه در صورت نیاز به درمان احتمالی
- آموزش محتوا یا ارائه خدمت به والدین پیش از انجام معاینه

منابع:

- ۱-آیین نامه اجرایی رتینوپاتی نوزادان نارس ویراست ۱۳۹۴
 - ۲-کتاب رتینوپاتی نوزادان نارس، گروه نویسندگان مرکز غربالگری رتینوپاتی نوزادان نارس بیمارستان فارابی، ۱۳۹۹، انتشارات تالیف، تهران، ایران
 - 3-Retinopathy of prematurity screening criteria in Iran.R.Roohipoor , Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2016 Jul;101(4):F288-93
 - 4-Focal points,AAO,Retinopathy of prematurity:Evolving concepts in diagnosis and management.Vol XXXIII,number 7,July 2015
 - 5-Prevalence and risk factors of retinopathy of prematurity in Iran.M.Zarei et al, *J Ophthalmic Vis Res* 2019; 14 (3): 291–298
 - 6- Evaluation of Risk Factors for Retinopathy of Prematurity in Preterm Neonates, *Minerva Pediatr* . 2015 Jun;67(3):231-7.
 - 7-Pediatrics, official journal of American academy of pediatrics, December 2018, 142 (6) e20183061
 - 8- Classification of retinopathy of prematurity: from then till now, Komal Agarwal ,Community Eye Health. 2018; 31(101): S4–S7.
- تاریخ اعتبار این راهنما از زمان ابلاغ به مدت ۳ سال می باشد و بعد از اتمام مهلت زمانی میبایست ویرایش صورت پذیرد.

بسمه تعالی

فرم تدوین راهنمای تجویز

عنوان استاندارد	RVU کد	کاربرد خدمت	افراد صاحب صلاحیت جهت تجویز	ارائه کنندگان اصلی صاحب صلاحیت	شرط تجویز		محل ارائه خدمت	تواتر خدمتی
					انديکاسيون	کنترل انديکاسيون		
معاینه جامع شبکه چشم نوزاد نارس	۹۰۱۹۴۷	سرپایی بستری	فوق تخصص نوزادان، متخصص کودکان، فلوشیپ رتین، متخصص چشم پزشکی، دستیار فوق تخصص نوزادان، دستیار تخصصی کودکان، دستیار تخصصی چشم پزشکی	فلوشیپ شبکه دوره دیده دارای گواهی معتبر متخصص چشم پزشکی دوره دیده به استناد گواهی از مراکز منتخب کمیته کشوری رتینوپاتی نوزادان نارس	براساس پروتکل کشوری مصوب کارگروه کشوری رتینوپاتی نوزادان نارس (آخرین ویراست ۱۳۹۴)، هر نوزاد نارس متولد شده با سن حاملگی کمتر از ۳۴ هفته و یا وزن کمتر و مساوی ۲۰۰۰ گرم نیازمند غربالگری می باشد. نوزادان بزرگتر از مورد فوق با تشخیص فوق تخصصی نوزادان یا متخصص کودکان ارجاع می گردند.	ندارد	بخش های مراقبت ویژه نوزادان - بخش های نوزادان - درمانگاهها - اتاق عمل های چشم پزشکی ➤ حداقل ۹ متر مربع فضا	زمان اولین معاینه بعد از تولد بر اساس سن حاملگی (Gesational age) مشخص میگردد: ۱- نوزادان متولد شده با سن حاملگی کمتر از ۲۷ هفته در هفته ی ۳۱ سن اصلاح شده به شرط اینکه هیچگاه بیشتر از ۶ هفته پس از تولد نباشد ۲- نوزادان ۲۷ هفته و بزرگتر در ۲۸ روزگی پس از تولد