



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت

بسمه تعالی

شماره ۷۳۵۳ / ۴۰۰۵
تاریخ ۱۳۹۸ / ۰۴ / ۰۳
پوست دارد

روسای محترم کلیه دانشگاهها / دانشکده های علوم پزشکی کشور
موضوع : ابلاغ استانداردهای ارائه خدمات گروه کودکان و نوزادان

با سلام و احترام

همانگونه که مطلع می‌باشید یکی از راهکارهایی که برای پیشگیری از افزایش هزینه‌های درمان و تحمیل بار اقتصادی سنگین به نظام سلامت و جامعه در کشورهای مختلف مورد توجه است، تدوین و نشر راهنماهای بالینی مبتنی بر شواهد است که به عنوان یکی از سیاست‌های برنامه تحول نظام سلامت و یکی از محورهای بسته‌های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی نیز مورد توجه می باشد. در همین راستا معاونت درمان تدوین محصولات دانشی را (راهنمای بالینی، استاندارد، پروتکل و ...) با اولویت خدمات پر تواتر، دارای پوشش بیمه ای، هزینه (خدمات، تجهیزات) با حضور جمعی از اساتید حوزه‌های مختلف، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل و سیاستگذاری و برنامه‌ریزی این امر را عهده‌دار شده است. لذا در راستای پویا سازی ارائه خدمات پزشکی و اجرایی نمودن بند "ث و ج" ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر اجازه تجویز خدمات و انجام خرید راهبردی سازمان های بیمه گر بر اساس دستورالعمل ها و راهنماهای بالینی توسط وزارت بهداشت، استانداردهای ارائه خدمات گروه نوزادان و کودکان به شرح ذیل به تصویب رسیده و از تاریخ ابلاغ قابل اجرا است.


بدیهی است ضمن تاکید بر ارائه خدمت در چارچوب استانداردهای مورد تائید وزارت متبوع، اعلام می گردد دانشگاه / دانشکده، انجمن ها و سازمان نظام پزشکی میبایست از این محصولات در آموزش های بازآموزی استفاده و سازمان های بیمه گر نیز بر اساس محصولات دانشی اقدام به خرید راهبردی نمایند. امید است با بهره مندی از تلاش جمعی و اطلاع رسانی در این زمینه، شاهد تحولی جدی در حوزه استقرار و بکارگیری راهنماها به منظور ارتقای کیفیت خدمات و کاهش هزینه های غیر ضروری باشیم.

- تعویض خون در نوزادان - کد ملی: ۳۰۲۳۶۰
- پونکسیون مایع نخاعی، درمانی یا تشخیصی در کودکان و نوزادان - کد ملی: ۶۰۰۹۳۵
- آسپیراسیون درمانی با وارد کردن تیوب با یا بدون Water Seal در نوزادان و کودکان - کد ملی: ۳۰۰۶۲۵
- فتوتراپی ساده - کد ملی: ۹۰۲۰۳۰
- فتوتراپی Intensive - کد ملی: ۹۰۲۰۳۲

دکتر قاسم جان بابایی

معاون درمان





معاونت درمان

دبیرخانه شورای راهبردی تدوین راهنماهای سلامت

شناسنامه و استاندارد خدمت

Intensive **موتراپی**

بهار ۱۳۹۸

تنظیم و تدوین:

جناب آقای دکتر سید علیرضا مرنندی رئیس انجمن علمی پزشکان نوزادان ایران

جناب آقای دکتر علی اکبر سیاری دبیر هیات ممکنه رشته تخصصی کودکان

جناب آقای دکتر یدالله زاهد پاشا دبیر هیات ممکنه طب نوزادان و پیرامون تولد

جناب آقای دکتر غلامرضا خاتمی رئیس انجمن پزشکان کودکان ایران

جناب آقای دکتر سید ابوالفضل افجه فوق تخصص نوزادان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

جناب آقای دکتر محمد حیدرزاده فوق تخصص نوزادان و رئیس اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سرکار خانم دکتر پریسا محقق فوق تخصص نوزادان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

سرکار خانم دکتر نسترن خسروی فوق تخصص نوزادان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

سرکار خانم دکتر زیبا مسیبی فوق تخصص نوزادان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

جناب آقای دکتر عباس حبیب الهی فوق تخصص نوزادان و کارشناس اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت، درمان و آموزش

پزشکی

تحت نظارت فنی:

گروه استانداردسازی و تدوین راهنماهای سلامت

دفتر ارزیابی فن آوری، استانداردسازی و تعرفه سلامت

دکتر سید سجاد رضوی، فرانک ندرخانی،

دکتر مریم خیری، آزاده حقیقی

الف) عنوان دقیق خدمت مورد بررسی (فارسی و لاتین) به همراه کد ملی:

فتوتراپی Intensive

کد ملی: ۹۰۲۰۳۲

ب) تعریف و تشریح خدمت مورد بررسی :

فتوتراپی شدید به معنی استفاده از سطح تابشی در طیف نوری مناسب با شدت $30\mu\text{w}/\text{cm}^2/\text{nm}$ یا بیشتر است که به سطح کل بدن نوزاد به جز چشم و ناحیه تناسلی تابانده شود که می تواند لامپ فلورسنت آبی، سفید، لامپ LED، تشکچه فایبر اپتیک (Bili Blanket) ... باشد.

ج) اقدامات یا پروسیجرهای ضروری جهت درمان بیماری:

• ارزیابی و اقدامات قبل از انجام فتوتراپی:

○ اندازه گیری سرمی بیلی روبین همراه با سایر آزمایشات مرتبط با زردی شدید بر اساس جدول شماره ۱

جدول شماره ۱ – ارزیابی نوزادان با زردی

ارزیابی ها
• گروه خون و Rh • آزمایش کومبس مستقیم • CBC (Complete Blood Count) و اسمیر خون محیطی • بیلی روبین توتال (TB: Total Bilirubin) و کونژوگه • اندازه گیری رتیگولوسیت • G6PD (Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase) • آلبومین (انتخابی)

○ پوشاندن چشم توسط چشم بند و ناحیه تناسلی توسط پوشک

○ در صورت استفاده از چند دستگاه فتو تراپی conventional، تنظیم دستگاه ها با حداقل فاصله نزدیک یا ممکن

○ اطمینان از طبیعی بودن دمای بدن نوزاد (کنترل علائم حیاتی)

○ اطمینان از کفایت تغذیه نوزاد با شیر مادر

○ گرفتن رگ محیطی و سرم درمانی بر اساس شرایط نوزاد و نظر پزشک

• ارزیابی و اقدامات حین انجام فتوتراپی:

○ برهنه بودن کامل نوزاد، پوشاندن چشم ها و اندام تناسلی با پوشش مخصوص جهت کاهش اثر نور بر این ارگان ها

○ اطمینان از طبیعی بودن دمای بدن نوزاد و سایر علائم حیاتی

○ توزین روزانه نوزاد

- کنترل دفع ادرار و مدفوع
- چک کردن بیلی روبین حداکثر هر ۴ تا ۶ ساعت یک بار (در صورت نزدیک بودن سطح بیلی روبین به عدد تعویض خون، اقدام لازم میبایست بر اساس استاندارد تعویض خون صورت پذیرد).
- پس از کاهش سطح بیلی روبین به کمتر از حد تعویض خون فواصل اندازه گیری بیلی روبین سرم میتواند به هر ۶ تا ۱۲ ساعت تغییر یا افزایش یابد.
- در زردی همولیتیک نوزادان (نظیر ناسازگاری ABO و Rh و ...) در صورت افزایش بیلی روبین، علیرغم فتوتراپی شدید و یا رسیدن سطح بیلی روبین به میزان ۲ تا ۳ میلی گرم کمتر از حد تعویض خون، تجویز IVIG توصیه میگردد.

• کنترل عوارض جانبی حین انجام فتوتراپی

- بررسی بشورات پوستی، بررسی طبیعی بودن دمای بدن نوزاد به منظور پیشگیری از اختلالات درجه حرارت
- اطمینان از کفایت شیر و مایعات دریافتی نوزاد
- انجام درمانهای لازم در صورت بروز عفونت چشم
- اندازه گیری مجدد بیلی روبین توتال و مستقیم در صورت مشاهده سندروم Bronze Baby

• ارزیابی و اقدامات بعد از اتمام فتوتراپی:

هرگاه سطح بیلی روبین سرم (برای نوزادان ۳۵ هفته و بالاتر) به ۲ تا ۳ عدد کمتر از آستانه نیازمند درمان (فتوتراپی Intensive)، برسد. بر اساس سن بعد از تولد، فتوتراپی Intensive قطع شده و ادامه درمان با فتوتراپی ساده انجام می یابد و اندازه گیری سطح بیلی روبین خون ۲۴ ساعت بعد بر حسب نظر پزشک انجام میشود.

(د) ویژگی های فرد/افراد صاحب صلاحیت جهت تجویز (Order) خدمت مربوطه و استاندارد تجویز:

پزشک فوق تخصص نوزادان، دستیار فوق تخصصی نوزادان، متخصص کودکان، دستیار تخصصی کودکان سال دوم و بالاتر

(ه) ویژگی های ارائه کننده اصلی صاحب صلاحیت جهت ارائه خدمت مربوطه:

پزشک فوق تخصص نوزادان، دستیار فوق تخصصی نوزادان، متخصص کودکان، دستیار تخصصی کودکان سال دوم و بالاتر

(و) عنوان و سطح تخصص های مورد نیاز (استاندارد) برای سایر اعضای تیم ارائه کننده خدمت:

ردیف	عنوان تخصص	تعداد مورد نیاز به طور استاندارد به ازای ارائه هر ۶-۴ خدمت	میزان تحصیلات مورد نیاز	سابقه کار و یا دوره آموزشی مصوب در صورت لزوم	نقش در فرایند ارائه خدمت
۱	پرستار	۱ نفر	کارشناس یا کاردان	حداقل ۶ ماه	کمک در مراقبت نوزاد حین فتوتراپی

(ز) استانداردهای فضای فیزیکی و مکان ارائه خدمت:

بخش NICU، نوزادان و کودکان بیمارستان بر اساس استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت

ج) تجهیزات پزشکی سرمایه ای به ازای هر خدمت:

- دستگاه فتوترابی Intensive به همراه امکانات مانیتورینگ مداوم نوزاد
- بر اساس شرایط و امکانات موجود استفاده از چند دستگاه فتوترابی ساده معادل دستگاه فتوترابی Intensive است
- دستگاه اسپکترو فتومتر (اختیاری)
- کات، انکوباتور و وارمر

ط) داروها، مواد و لوازم مصرفی پزشکی جهت ارائه هر خدمت:

ردیف	اقلام مصرفی مورد نیاز	میزان مصرف (تعداد یا نسبت)
۱	چشم بند	به میزان مورد نیاز
۲	پوشک	به میزان مورد نیاز
۳	سرم تزریقی	در صورت نیاز
۴	پروب پالس اکسی متری یکبار مصرف یا دائمی	۱ عدد
۵	لامپ دستگاه	بر اساس دستور مصرف کارخانه
۶	IVIG	در صورت نیاز
۷	سرنگ	به میزان مورد نیاز
۸	سرم تزریقی	به میزان مورد نیاز
۹	سرسوزن	به میزان مورد نیاز
۱۰	اسکالپ وین	به میزان مورد نیاز
۱۱	چسب	به میزان مورد نیاز
۱۲	پنبه الک	به میزان مورد نیاز
۱۳	ویال سوکروز ۲۴٪	به میزان مورد نیاز

ی) استانداردهای ثبت:

شرح حال، معاینه و تشخیص های افتراقی ، سیر بیماری ، تعداد روزهای درمان ،درجه حرارت بدن و علائم حیاتی، میزان بیلی روبین و سایر آزمایشات انجام شده، ذکر درمانهای انجام شده و عوارض در صورت بروز

ک) اندیکاسیون های دقیق جهت تجویز خدمت:

اندیکاسیون فتوترابی شدید در نوزادان رسیده و نارس بر اساس جدول شماره ۲ و ۳ می باشد:

جدول شماره ۲- فتوترابی شدید در نوزادان با وزن تولد کمتر از ۲۵۰۰ گرم / با سن بارداری کمتر از ۳۵ هفته

وزن تولد (گرم)	میزان بیلی روبین
کمتر از ۱۰۰۰	۸ mg/dL
۱۰۰۰ تا ۱۴۹۹	۹ mg/dL
۱۵۰۰ تا ۱۹۹۹	۱۰ mg/dL
۲۰۰۰ تا ۲۴۹۹	۱۱ mg/dL

➤ استفاده از فتوترابی شدید در نوزادان نارس و کم وزن بویژه نوزادان با وزن کمتر از ۱۵۰۰ گرم با احتیاط زیاد صورت گیرد.

جدول شماره ۳- فتوتراپی شدید در نوزادان با وزن تولد مساوی یا بیشتر از ۲۵۰۰ گرم/ با سن بارداری ۳۵ هفته و بیشتر

میزان بیلی روبین ساعت پس از تولد	نوزاد ترم سالم بدون عامل خطر	نوزاد ترم با عامل خطر، نوزاد ۳۵ تا ۳۷ هفته / نوزاد با وزن تولد بیشتر یا مساوی ۲۵۰۰ گرم بدون عامل خطر	نوزاد ۳۵ تا ۳۷ هفته / نوزاد با وزن تولد بیشتر یا مساوی ۲۵۰۰ گرم با عامل خطر
۰ تا ۲۴ ساعت	>۱۲ mg/dL	>۱۰ mg/dL	>۸ mg/dL
۲۵ تا ۴۸ ساعت	>۱۴ mg/dL	>۱۲ mg/dL	>۱۰ mg/dL
بیشتر از ۴۸ ساعت	>۱۶ mg/dL	>۱۴ mg/dL	>۱۲ mg/dL

➤ ارقام موجود در جدول های فوق با توجه به شرایط کلان کشور بومی گردیده است .

ل) شواهد علمی در خصوص کنترالندیکاسیون های دقیق خدمت:

بیماری پورفیری

ن) مدت اقامت در بخش های مختلف بستری جهت ارائه هر بار خدمت مربوطه:

بر حسب شرایط بیمار متفاوت است. هرگاه سطح بیلی روبین سرم (برای نوزادان ۳۵ هفته و بیشتر) به ۲ تا ۳ عدد کمتر از آستانه نیازمند درمان (فتوتراپی Intensive)، برسد. بر اساس سن بعد از تولد، فتوتراپی Intensive قطع شده و ادامه درمان با فتوتراپی ساده انجام می یابد و پس از قطع فتوتراپی ساده بر اساس بیماری زمینه ای مدت اقامت تعیین می گردد.

س) موارد ضروری جهت آموزش به بیمار :

- مراجعه به پزشک معالج جهت پیگیری روند بهبود بیماری
- آموزش شیردهی و افزایش دفعات شیردهی
- پرهیز از انجام حمام، مصرف داروهای سستی، فنوباریتال (به جز کریگلر نجار تیپ ۲) و سایر داروها با تاثیر نامشخص

منابع:

1. Kaplan M, Wong R, Sibley E, Stevenson D: Neonatal Jaundice & liver Disease. In: Martin R, Fanaroff A, Walsh M (eds) Fanaroff & Martin Neonatal-Perinatal Medicine; 10th Ed; 2015
2. Gomella T (ed): Neonatology; 7th Ed; 2013
3. Maisles M, Watchko J: Jaundice. In: Macdonald M, Seshia M (eds) Avery's Neonatology; 7th Ed; 2016
4. Ann R. Stark, Eric C Eichenwald, Ann R. Hansen, Camilia R. Stark: Neonatal Hyperbilirubinemia In Cloherty and Starks Manual of Neonatal Care; 8th Ed; 2016

- تاریخ اعتبار این راهنما از زمان ابلاغ به مدت ۲ سال می باشد و بعد از اتمام مهلت زمانی میبایست ویرایش صورت پذیرد.

بسمه تعالی
فرم تدوین راهنمای تجویز



عنوان استاندارد	کد RVU	کاربرد خدمت	افراد صاحب صلاحیت جهت تجویز	ارائه کنندگان اصلی صاحب صلاحیت	شرط تجویز	محل ارائه خدمت	ارزیابی و اقدامات بعد از اتمام فتوتراپی																
فتوتراپی شدید	۹۰۲۰۳۲	بستری	پزشک فوق تخصص نوزادان، دستیار فوق تخصصی نوزادان، متخصص کودکان، دستیار تخصصی کودکان سال دوم و بالاتر	پزشک فوق تخصص نوزادان، دستیار فوق تخصصی نوزادان، متخصص کودکان، دستیار تخصصی کودکان سال دوم و بالاتر	فتوتراپی شدید در نوزادان با وزن تولد کمتر از ۲۵۰۰ گرم / با سن بارداری کمتر از ۳۵ هفته	بیمارستان	برهنه بودن کامل نوزاد، پوشاندن چشم ها و اندام تناسلی با پوشش مخصوص جهت کاهش اثر نور بر این ارگان ها اطمینان از طبیعی بودن دمای بدن نوزاد و سایر علائم حیاتی توزین روزانه نوزاد کنترل دفع ادرار و مدفوع چک کردن بیلی روبین حداکثر هر ۴ تا ۶ ساعت یک بار (در صورت نزدیک بودن سطح بیلی روبین به عدد تعویض خون، اقدام لازم میبایست بر اساس استاندارد تعویض خون صورت پذیرد.) پس از کاهش سطح بیلی روبین به کمتر از حد																
					فتوتراپی شدید در نوزادان با وزن تولد مساوی یا بیشتر از ۲۵۰۰ گرم/ با سن بارداری ۳۵ هفته و بیشتر																		
					<table><tr><td>وزن تولد (گرم)</td><td>میزان بیلی روبین</td></tr><tr><td>کمتر از ۱۰۰۰</td><td>۸ mg/dL</td></tr><tr><td>۱۴۹۹ تا ۱۰۰۰</td><td>۹ mg/dL</td></tr><tr><td>۱۵۰۰ تا ۱۹۹۹</td><td>۱۰ mg/dL</td></tr><tr><td>۲۰۰۰ تا ۲۴۹۹</td><td>۱۱ mg/dL</td></tr></table>	وزن تولد (گرم)	میزان بیلی روبین	کمتر از ۱۰۰۰	۸ mg/dL	۱۴۹۹ تا ۱۰۰۰	۹ mg/dL	۱۵۰۰ تا ۱۹۹۹	۱۰ mg/dL	۲۰۰۰ تا ۲۴۹۹	۱۱ mg/dL								
وزن تولد (گرم)	میزان بیلی روبین																						
کمتر از ۱۰۰۰	۸ mg/dL																						
۱۴۹۹ تا ۱۰۰۰	۹ mg/dL																						
۱۵۰۰ تا ۱۹۹۹	۱۰ mg/dL																						
۲۰۰۰ تا ۲۴۹۹	۱۱ mg/dL																						
					<table><tr><td>هفته تولد و عامل خطر</td><td>نوزاد ترم سالم بدون عامل خطر</td><td>نوزاد ترم با عامل خطر، نوزاد ۳۵ تا ۳۷ هفته / نوزاد با وزن تولد بیشتر یا مساوی ۲۵۰۰ گرم، بدون عامل خطر</td><td>نوزاد ۳۵ تا ۳۷ هفته / نوزاد با وزن تولد بیشتر یا مساوی ۲۵۰۰ گرم، با عامل خطر</td></tr><tr><td>ساعت ۰ تا ۲۴</td><td>>۱۲ mg/dL</td><td>>۱۰ mg/dL</td><td>>۸ mg/dL</td></tr><tr><td>۲۵ تا ۴۸ ساعت</td><td>>۱۴ mg/dL</td><td>>۱۲ mg/dL</td><td>>۱۰ mg/dL</td></tr><tr><td>بیشتر از ۴۸ ساعت</td><td>>۱۶ mg/dL</td><td>>۱۴ mg/dL</td><td>>۱۲ mg/dL</td></tr></table>	هفته تولد و عامل خطر	نوزاد ترم سالم بدون عامل خطر	نوزاد ترم با عامل خطر، نوزاد ۳۵ تا ۳۷ هفته / نوزاد با وزن تولد بیشتر یا مساوی ۲۵۰۰ گرم، بدون عامل خطر	نوزاد ۳۵ تا ۳۷ هفته / نوزاد با وزن تولد بیشتر یا مساوی ۲۵۰۰ گرم، با عامل خطر	ساعت ۰ تا ۲۴	>۱۲ mg/dL	>۱۰ mg/dL	>۸ mg/dL	۲۵ تا ۴۸ ساعت	>۱۴ mg/dL	>۱۲ mg/dL	>۱۰ mg/dL	بیشتر از ۴۸ ساعت	>۱۶ mg/dL	>۱۴ mg/dL	>۱۲ mg/dL		
هفته تولد و عامل خطر	نوزاد ترم سالم بدون عامل خطر	نوزاد ترم با عامل خطر، نوزاد ۳۵ تا ۳۷ هفته / نوزاد با وزن تولد بیشتر یا مساوی ۲۵۰۰ گرم، بدون عامل خطر	نوزاد ۳۵ تا ۳۷ هفته / نوزاد با وزن تولد بیشتر یا مساوی ۲۵۰۰ گرم، با عامل خطر																				
ساعت ۰ تا ۲۴	>۱۲ mg/dL	>۱۰ mg/dL	>۸ mg/dL																				
۲۵ تا ۴۸ ساعت	>۱۴ mg/dL	>۱۲ mg/dL	>۱۰ mg/dL																				
بیشتر از ۴۸ ساعت	>۱۶ mg/dL	>۱۴ mg/dL	>۱۲ mg/dL																				

تعویض خون، فواصل اندازه گیری بیلی روبین سرم میتواند به هر ۶ تا ۱۲ ساعت تغییر یا افزایش یابد. در زردی همولیتیکی نوزادان (نظیر ناسازگاری ABO و Rh و ...) در صورت افزایش بیلی روبین، علیرغم فتوتراپی شدید و یا رسیدن سطح بیلی روبین به میزان ۲ تا ۳ میلی گرم کمتر از حد تعویض خون، تجویز IVIG توصیه میکرد.									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

• تاریخ اعتبار این راهنما از زمان ابلاغ به مدت ۲ سال می باشد و بعد از اتمام مهلت زمانی میبایست ویرایش صورت پذیرد.